

Cypermethrin-SINTAGRO

Insecticide protection du bois et pour le traitement du bois rond contre le bostryche liséré et des dermestoides



- Matière active: 10 % (100 g/L) Cyperméthrine
- Produit concentré émulsionnable à diluer dans de l'eau, incolore, densité 0,92 g/cm³
- Effet de longue durée, haut taux de pénétration
- Peut-être repeint sans problème
- Bidons pratiques à 1 L et à 5 L

Traitement des grumes	Protection du bois
Pour le traitement du bois rond en forêt et sur les places de stockage contre le bostryche liséré et contre les dermestoides.	Produit concentré pour la protection du bois de construction et du bois scié contre les insectes xylophages comme le capricorne des maisons, petite vrillette, lycte brun. Domaines d'application: Bois de sciage, bois de construction, voliges, charpentes, bâtiments agricoles, etc.
Dosage: 0,45 % = 45 ml dans 10 L d'eau = 450 ml dans 100 L d'eau	Dosage: 1,3 % = 130 ml dans 10 L d'eau = 1,3 L dans 100 L d'eau
La bouillie préparée s'applique à l'aide d'une pompe à moteur ou avec une pompe à dos. Consommation: 2,5 L de bouillie préparée par m ³ de bois. Traiter le bois à temps au printemps, avant qu'il soit attaqué par les ravageurs. Dès mi-mars avant les premiers jours chauds et par temps sec. Répéter fin mai le traitement contre les dermestoides.	Application: Pulvérisation, trempage, aspersion ou par injection. Consommation (pulvérisation): 300 ml de bouillie préparée par m ² . Destiné au traitement préventif et curatif: lp: Efficacité préventif contre les insectes lc: Efficacité curatif contre les insectes
<ul style="list-style-type: none"> • Les produits de pulvérisation des grumes doivent être appliqués sur l'écorce sèche et propre. • Il faut que le produit puissent sécher pendant 12 heures au moins avant des précipitations. • Veiller à ce que la quantité de bouillie recommandée (l/m³) soit appliquée sur toute la surface de bois. • Les troncs, y compris les faces coupées, doivent être aspergés abondamment de tous les côtés et sur toute leur longueur. • Traitement couche par couche en cas de grandes quantités de bois. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'état de surface des bois doit être propre et sec. • Veiller à un mouillage complet de toute la surface de bois. Eviter les ombres de pulvérisation. • Ne pas traiter des surfaces accessibles aux animaux. • Il faut que le produit puissent sécher pendant 12 heures au moins avant des précipitations.

Xn, N – Utilisez les produits de protection du bois avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stockage : Tenir le produit bien fermé dans l'emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.